

| ние/ Признак | Краснуха | Корь | Скарлатина | Ветряная оспа |
|-------------------|---|--|--|--|
| Характер сыпи | Мелко- пятнистая, бледная, розовая | Пятнистая, розовая, обильная, иногда сливная | Мелкоточечная на розовом фоне | Полиморфная: пятнышки, бугорки, пузырьки, гнойнички |
| Локализация | Преимущественно на разгибательных поверхностях (конечности, спина, ягодицы) | 1-й день на лице и шее, 2-й день на туловище, 3-й день на конечностях | Внутренние поверхности конечностей, боковые — туловища, на лице кроме носогубного треугольника | Повсеместно, включая волосистую часть головы |
| Исход сыпи | Исчезает бесследно | Пигментация 2–3 недели | Шелушение ладоней, стоп, иногда лица и туловища | Образование корочек, отпадающих на 9–10 день |
| Температура | Субфебрильная | Высокая | Высокая | Субфебрильная |
| Другие проявления | Увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов | Обильный насморк, кашель, слезотечение, сыпь на нёбе, пятнышки на слизистой оболочке щек | Боль в горле при глотании, «пылающий» зев, густо обложененный, очищающийся с краев язык | Возможны элементы сыпи на слизистых оболочках полости рта, конъюнктивах |
| Изменения крови | Снижение лейкоцитов, увеличение числа лимфоцитов и плазматических клеток | Снижение лейкоцитов, увеличение числа лимфоцитов, отсутствие эозинофилов, повышение | Увеличение числа лейкоцитов и нейтрофилов, повышение СОЭ | Снижение лейкоцитов, увеличение числа лимфоцитов, умеренное увеличение СОЭ |